

# Wenn's krecht und fleucht: Schädlinge in der Mietwohnung

Mäuse, Motten, Silberfische: Die Liste der unliebsamen Hausviecher ist lang. Dieses Merkblatt verschafft einen Überblick der Haushaltsschädlinge und gibt Tipps, wie man diesen am besten zu Leibe rückt.

Die Informationen und Fakten über die Schädlinge wurden der Broschüre «Haushaltsschädlinge» des öko-Forums Luzern ([www.oeko-forum.ch](http://www.oeko-forum.ch)) und der Website des Gesundheits- und Umwelddepartements der Stadt Zürich ([www.stadt-zuerich.ch/gud/](http://www.stadt-zuerich.ch/gud/)) entnommen.

## Schädlingsbekämpfung – wer bezahlt?

Treten in einer Mietwohnung Schädlinge auf, handelt es sich rechtlich gesehen um einen Mangel am Mietobjekt. Vermieter\*innen sind in solchen Fällen verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen und die Kosten dafür zu übernehmen. Eine Ausnahme gilt, wenn die Schädlingsbekämpfung mit wenig Aufwand zu bewerkstelligen ist und für deren Ausführung kein besonderes Fachwissen erforderlich ist oder nicht mehr als 150 Franken kostet. Dann muss die Mieterschaft selbst dafür aufkommen. Mieter\*innen können also von der Vermieterschaft nicht verlangen, dass sie die Bekämpfung von Dörrobstmotten übernimmt. Ebenfalls kein Anspruch an die Vermieterschaft besteht, wenn man einfach abwarten kann, bis die Insekten wieder verschwinden. In solchen Fällen liegt mietrechtlich gesehen kein Mangel vor.

### Haftpflicht nur bei striktem Beweis

Zu Lasten der Mieterschaft gehen die Kosten der Schädlingsbekämpfung dann, wenn man ihr vorwerfen kann, die Tiere unter Verletzung der mietrechtlichen Sorgfaltspflicht eingeschleppt zu haben. Dies ist etwa der Fall, wenn Haustiere Flöhe heimbringen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der betreffenden Mieterschaft eine Sorgfaltspflichtverletzung nachweisen lässt. Ein vager Verdacht genügt nicht.

### Wer hilft?

Unternimmt die Vermieterschaft nichts gegen Schädlinge, obwohl sie dazu verpflichtet wäre, können Mieter\*innen durch eine amtliche Hinterlegung des Mietzinses

Druck machen. Über das Vorgehen lassen Sie sich am besten durch den Mieterinnen- und Mieterverband (MV) beraten. Wie bei anderen Mängeln am Mietobjekt hat die Mieterschaft bei Schädlingsbefall Anspruch auf eine Mietzinsreduktion. Dies gilt allerdings nur, wenn die Vermieterschaft den Mangel kennt. Deshalb empfiehlt es sich, sofort zu reklamieren, am besten mit eingeschriebenem Brief.

## Praktisches Wissen

### Das Haus als Lebensraum für Schädlinge

Das Klima in den Häusern hat sich in den letzten Jahrzehnten zugunsten der Schädlinge verändert. Arten, die feuchte Räume bevorzugen, finden diese ebenso wie trockenheitsliebende Arten. Ähnlich ist es mit lichtliebenden und lichtmeidenden Schädlingen. In modernen Häusern sorgt die Zentralheizung für einen Anstieg der Temperatur und einen Rückgang der relativen Luftfeuchtigkeit im Keller. Rohrleitungen sind in senkrecht verlaufenden Schächten gemeinsam verlegt. Damit sind Wanderwege für z.B. Schaben, Ameisen, Ratten, Mäuse geschaffen. Sie können sich auf alle Etagen ausbreiten.

Die meisten Lebensmittel werden heute sicher in der Küche gelagert, unbeheizte Vorratskammern oder Keller gibt es kaum noch. Wo gekocht wird, sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Regel für Schädlinge äusserst günstig. Hinzu kommt, dass durch Einbauschränke, festinstallierte Herde und Kühlschränke geschützte Ecken und Ritzen geschaffen werden, die praktisch nie zu erreichen sind und somit hervorragende Verstecke für Schädlinge (Ameisen, Schaben, Mäuse) bilden.

Lebensmittel lagern oft lange und stehen den Schädlingen ständig zur Verfügung. Dadurch ist eine Massenvermehrung über Generationen hinweg möglich. Lange und unsachgemäss gelagerte Abfälle locken Fliegen, Schaben, Mäuse und Ratten an. Essigfliegen können sich in grossen Mengen an faulendem Obst entwickeln. Dem Schädlingsbefall kann vorgebeugt werden, wenn der «Lebensraum Haus» für Schädlinge ungemütlich gestaltet wird.

### **Wie werden Lebensmittel befallen?**

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie Schädlinge in Küche und Vorratshaltung gelangen können: das aktive Eindringen und das passive Einschleppen. Um Vorräte aktiv zu befallen, müssen Schädlinge ihren Weg zu den Lebensmitteln finden. Meist werden sie vom Geruch des Lebensmittels angezogen. Um einem Schädlingsbefall vorzubeugen, ist es daher sinnvoll, Lebensmittel geruchsdicht in Gläser, Vorratsdosen oder Büchsen zu verpacken. Oft werden Schädlinge unbeabsichtigt in den Vorrat eingeschleppt, wenn bereits befallene Lebensmittel und Verpackungen eingelagert werden. Neue Ware sollte gründlich auf Schädlingsbefall untersucht werden.

### **Welche Lebensmittel werden bevorzugt befallen?**

Schädlinge brauchen alle Nährstoffe, die der Mensch auch benötigt: Kohlenhydrate, Eiweisse, Fette, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine usw. Es verwundert also nicht, dass sie praktisch alle Lebensmittel befallen.

Es gibt es aber auch Schädlinge, die sich auf eine bestimmte Nahrung eingestellt haben. Manche leben nur von Produkten tierischer Herkunft, andere bevorzugen pflanzliche Nahrung. Arten, die alles konsumieren, was an organischer Substanz angeboten wird, sind Allesfresser. Von der Palette der Vorräte, die in einem normalen Haushalt vorkommen, sind bestimmte Produkte besonders gefährdet. Das sind in erster Linie Getreideprodukte wie Mehl, Griess und Teigwaren.

Eine andere Gruppe von Nahrungsmitteln, die häufig befallen wird, umfasst Backzutaten wie Nüsse, Mandeln oder Rosinen. Sie sind auch besonders gefährdet, weil sie nicht laufend verbraucht werden. Offene Packungen liegen oft wochen- oder monatelang im Vorratsschrank. Schädlinge, die den Weg hierher finden, können sich ungestört über lange Zeit entwickeln und dann auf andere Produkte übergehen.

An Dörrobst, Datteln oder Feigen können sich verschiedene Milbenarten vermehren. Wegen ihrer geringen Grösse bleiben sie oft unbemerkt und werden so nicht selten sogar mitgegessen.

Schokolade und Schokoladenerzeugnisse werden vor allem von gewissen Mottenarten befallen. Massenvermehrungen kommen im Haushalt aber nicht häufig vor.

Weniger gefährdet sind Hülsenfrüchte, vor allem wegen ihrer Härte. Der Bohnenkäfer, ein früher weit verbreiteter Grossschädling, tritt heute nur noch selten in Erscheinung.

Gewürze haben ihre spezielle Schädlingsfauna. Da auch diese Produkte manchmal sehr lange lagern, kann es vorkommen, dass es in ihnen von Schädlingen wimmelt.

Schliesslich hat eine veränderte Ernährungsweise dazu geführt, dass im Haushalt Produkte vorrätig

gehalten werden, die es bis vor kurzem dort kaum gab, z.B. Getreidearten und verschiedenartige Samen. Mit ihnen sind neue Schädlinge in die häuslichen Vorratsschrank gekommen, die normalerweise nur in grösseren Getreidelagern anzutreffen sind.

Produkte tierischer Herkunft wie Fleisch, Fleischwaren, Fisch oder Käse, können wiederum von anderen gefährlichen Schädlingen befallen werden. Diese Lebensmittel sind jedoch in der Regel nur kurzzeitig dem Angriff von Schadorganismen ausgesetzt, da sie vorwiegend in Dosen, im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe aufbewahrt werden.

Im Grunde können alle Lebensmittel von Schädlingen befallen werden. Besonders gefährdet sind solche, die lange haltbar sind und ungeschützt aufbewahrt werden.

### **Welche Schäden verursachen Vorratsschädlinge?**

Schädlinge sind «Fresskonkurrenten» des Menschen. Die Schäden sind also oft in erster Linie Frassschäden. Wo Schädlinge vorkommen, treten auch Verschmutzungen auf. Tote Tiere, Häutungsreste, Kot, Urin, Spinnfäden oder (bei Nagetieren) Haare machen Nahrungsmittel ungeniessbar und können Gesundheitsschäden verursachen. Reste von Insekten (Motten und Käfern) können Hauterkrankungen, Allergien der Atemwege, Störungen im Darmtrakt oder Augenschäden hervorrufen.

Durch Ausscheidungen der Tiere oder durch die Veränderung von Inhaltsstoffen können Geruch und Geschmack des Lebensmittels soweit beeinträchtigt werden, dass es nicht mehr geniessbar ist. Manche Schädlinge verändern das Aussehen der Lebensmittel, indem sie Löcher in das befallene Gut fressen. Qualitätsmerkmale, wie Inhaltsstoffe, Keim- oder Backfähigkeit, können verändert werden, wodurch ein Produkt seinen Nährwert oder seine Verwertbarkeit verliert.

Doch nicht nur direkte Schäden, sondern auch indirekte oder Folgeschäden sind von Bedeutung. So können Vorratsschädlinge Mikroorganismen (z.B. Bakterien und Pilze) auf ein Nahrungsmittel übertragen. Diese können das Lebensmittel noch weiter vernichten, wenn es sich um kohlenhydrat-, fett- oder eiweisszersetzende Mikroorganismen handelt, oder aber – was noch gefährlicher ist – Krankheiten bei Menschen (und Haustieren) hervorrufen, wenn es sich um pathogene (krankheitserregende) Erreger handelt.

Wichtige Krankheitserreger wie Salmonellen, Streptokokken u.a. können zum Beispiel von Fliegen, Schaben oder Ratten übertragen werden. Bei dem Befall eines Lebensmittels durch Schädlinge kann sich dieses so stark verändern, dass sich zusätzlich andere Organismen

ansiedeln und vermehren können: Schimmelpilze, Milben und Schimmelkäfer finden optimale Bedingungen vor und fördern die Vernichtung des Lebensmittels.

Weitere Schäden durch Schädlinge sind Zerstörungen von Materialien. So können sie Verpackungen zerfressen, wenn sie an ein Nahrungsgut heran wollen oder wenn sie sich aus einer befallenen, verpackten Ware herausarbeiten. Schränke und Regale, können zerstört werden, wenn zum Beispiel die Raupen der vorratsschädigenden Motten Vertiefungen fressen, um sich darin zu verpuppen. Aber auch Möbel, Textilien oder Bücher können als Verpuppungsort oder als Material für den Nestbau dienen.

Schliesslich sind finanzielle Einbussen zu erwähnen, die durch Vorratsschädlinge entstehen. Hierzu zählen die Kosten durch die Vernichtung von befallenen Lebensmitteln, Aufwendungen für eventuell notwendige Bekämpfungsmassnahmen, Anschaffung von schädlingssicheren Vorratsbehältern, Ausgaben für andere vorbeugende Massnahmen, Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen.

### **Wie ist ein Schädlingsbefall zu erkennen?**

Schädlinge sind nicht nur fast durchwegs sehr klein, sie sind auch meist lichtscheu. Es ist deshalb bei einer oberflächlichen Betrachtung von Lebensmitteln nicht immer einfach, einen Befall zu erkennen. Bei der laufenden Kontrolle der Vorräte sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

- Die sorgfältige äussere Kontrolle muss sich besonders auf die Vorratschränke konzentrieren. Hier können bei einem Befall erwachsene Schädlinge, umherlaufende Raupen oder versponnene Puppen gefunden werden: hinter Leisten, unter Verpackungen, in Winkeln. Ein heller Untergrund des Vorratschranks erleichtert das Auffinden der Tiere.
- Enge Spalten hinter Fussleisten oder Hohlräume unter Einbauschränken und Elektrogeräten sollten gezielt abgesehen werden. Danach sollten die Verpackungen auf Frassschäden hin untersucht werden. Besonders deren Ecken, Kanten und Falten sind oft den Mundwerkzeugen der Schädlinge ausgesetzt.
- Beim Öffnen von Verpackungen sollte man schnell einen Blick hineinwerfen, weil sich Schädlinge evtl. bei Lichteinfall umgehend in tiefere Schichten einbohren. Raupen – die Larven von vorratsschädigenden Mottenarten – halten sich bevorzugt in den äusseren Schichten der Vorräte auf. Da sie beim Umherlaufen ständig einen Spinnfaden ausscheiden, kann man ihre Anwesenheit meist leicht daran erkennen, dass sich diese Fäden auf der Oberfläche des Gutes und an der Innenseite der Verpackung entlangziehen. Sie bleiben auch erhalten, wenn der Schädling das Lebensmittel schon lange verlassen hat.

- Auf Störungen reagieren Schädlinge meist mit Fortlaufen. Leert man eine Packung aus, so kann man bei einem Befall Tiere beobachten, die aus dem ausgeschütteten Lebensmittel davonkrabbeln. Auch hier erleichtert eine helle Unterlage das Erkennen.
- Sind Schädlinge tief in ein Lebensmittel eingedrungen, kann man oft ein einfaches Verfahren anwenden, um einen Befall nachzuweisen: das Sieben. Voraussetzung ist, dass sich das Gut dafür eignet. Handelt es sich um Mehl, Griess oder ähnlich feine Ware, bleiben die Schädlinge in einem feinen Sieb zurück. Bei gröberen Produkten, etwa Getreide, Graupen oder Hülsenfrüchten, fallen sie durch ein Sieb mit einer gröberen Maschenweite hindurch und können so leicht erkannt werden.

### **Wie können Schädlinge bekämpft werden?**

Da eine Vielzahl von Schäden auftreten kann, darf ein Schädlingsbefall nicht toleriert werden. Der erste Schritt muss immer sein, die befallenen Lebensmittel zu beseitigen. Das heisst aber nicht, wahllos die ganzen Vorräte wegwerfen, sondern wirklich nur die, die befallen sind. Damit vom Abfalleimer aus kein neuer Befall erfolgt, muss der Kehrichtsack, fest verschlossen sofort aus der Wohnung gebracht werden.

Nur wenige Bekämpfungsmethoden sind zur Anwendung im Haushalt empfehlenswert. Benutzen Sie möglichst keine chemischen Bekämpfungsmittel. Bei unsachgemässer Anwendung können sie eine Gefahr für Menschen, vor allem für Kinder und auch für Haustiere sein. Gute Tipps sind auf der Website Beratungsstelle Schädlingbekämpfung der Stadt Zürich zu finden: [www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung](http://www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung) oder beim öko-Forum Luzern: [www.oeko-forum.ch](http://www.oeko-forum.ch)

### **Wie kann einem Schädlingsbefall vorgebeugt werden?**



Vorbeugen ist bekanntlich immer besser als heilen. Das gilt im besonderen Masse für den Schutz von Küche und Vorräten vor Schädlingen, da die Bekämpfung sehr schwierig ist:

- Vorratslager sauber und übersichtlich halten. Bei Regalen (möglichst aus Metall) auf Fussbodenfreiheit achten, damit sich unter ihnen kein Schmutz anhäufen kann. Verstecke vermeiden oder beseitigen. Schon 1 mm breite Spalten sind optimale Verstecke für Schädlinge.
- Neue Ware auf eventuellen Befall kontrollieren.
- Wenn möglich, Vorräte in dicht schliessenden Behältern aus Glas, Metall oder Kunststoff aufbewahren. Verpackungen aus Papier oder Kunststoffolie bieten keinen ausreichenden Schutz. Der aromatische Abschluss verhindert das Anlocken der Schädlinge.

## Kurzporträts wichtiger Schädlinge

### Ameise (Wegameise)

- **Aussehen und Eigenschaften:** 4 mm lang, gelblich-braun bis schwarzbraun. Die in Vorräten vorkommenden Tiere sind flügellose Arbeiterinnen. Seltener sind in Häusern Nester, dann treten auch geflügelte Formen auf.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Zuckerhaltige Produkte.
- **Schäden, Befall:** Frass, Verunreinigung der Nahrung durch festklebende Tiere.
- **Bekämpfung:** Ameisen leben normalerweise im Freiland und wandern in die Wohnungen ein. Gegen diese «Ameisenstrassen» muss man nicht zwingend mit Köderdosen vorgehen: Ein altbewährtes Hausmittel ist das Streuen von Zimt. Aber auch der Duft von Lavendel, Wermut, Pfefferminze, oder Thymian vertreibt die kleinen ungebetenen Gäste effektiv aus der Wohnung.




### Bettwanzen

- **Aussehen und Eigenschaften:** Ovale Eier, weisslich, ca. 2.5 mm lang und 0.5 mm im Durchmesser. Erwachsene Tiere 4–6 mm lang und flach. Vollgesogen können sie fast 10 mm lang werden.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Bewohnte, geschlossene Räume, in der Nähe von menschlichen Schlaf- und Ruheplätzen. Bevorzugen Wärme und Dunkelheit und verstecken sich daher in Spalten, Ritzen und Fugen.
- **Schäden, Befall:** Ernähren sich von menschlichem und tierischem Blut, ebevorzugt nachts.
- **Bekämpfung:** Nur mit professioneller Schädlingsbekämpfungsfirma möglich.




### Essig- oder Taufliegen

- **Aussehen und Eigenschaften:** Larve ist kopf- und fusslose Made, 5–6 mm lang. Erwachsene Tiere 2–4 mm lang, schwarz, dunkelbraun oder gelb gefärbt.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Obst und Gemüse, Essig, Bier und Wein, vor allem wenn es bereits in Zersetzung übergegangen ist, Larven ernähren sich hauptsächlich von den dort auch vorhandenen Mikroorganismen (Pilze, Hefe, Bakterien).
- **Schäden, Befall:** in Lebensmitteln, Übertragung von Mikroorganismen.
- **Bekämpfung:** Sauberkeit, schnelle Beseitigung von Abfällen, um Anlocken zu vermeiden, Lebensmittel mit Folie abdecken.




## Fliegen

- **Aussehen und Eigenschaften:** Eier gelblich-weiss, länglich. Larven sind weissliche, fuss- und kopflose Maden, bis 10 mm lang. Erwachsene Tiere sind die typischen bekannten Fliegen, gescheckt, goldgrün, oder dunkelblau bis schwarz.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Fleischwaren, Fisch, Käse und in Zersetzung befindliche organische Substanzen. Stubenfliegen bevorzugen pflanzliche, andere Fliegen tierische Stoffe. Im Freiland überall an Aas und Exkrementen. Eiablage in Klumpen, meist versteckt in Vertiefungen der Lebensmittel, Larven können kurz nach der Eiablage ausschlüpfen und sich einbohren, Befall deshalb oft unbemerkt.
- **Schäden, Befall:** Frass, Verflüssigung der Produkte, Übertragung von Krankheitserregern und lebensmittelezersetzenden Pilzen und Bakterien, Belästigung.
- **Bekämpfung:** Gefährdete Lebensmittel nicht offen liegen lassen, bei starkem und dauerndem Befall (Nähe von Stallungen) Fenster mit Fliegengitter versehen, eventuell Fliegenklebefallen aufhängen.




## Kleidermotten

- **Aussehen und Eigenschaften:** Die Kleidermotte ist gelblich-weiss und wird ca. 9 mm lang. Andere Arten sehen ähnlich aus: Die Weibchen legen bis zu 100 Eier einzeln an Stoffen ab. Es dauert etwa zwei Wochen, bis die gelblichen Larven (Raupe) schlüpfen.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Textilien aus tierischen Fasern. Die befallenen Textilien und Stoffe werden völlig durchlöchert.
- **Schäden, Befall:** Die befallenen Gewebe sind mit sichtbaren Gespinnströhren durchzogen. Diese Röhren erschweren eine effektive Bekämpfung sehr.
- **Bekämpfung:** Gelagerte Kleidungsstücke sollten regelmässig kontrolliert, kühl und trocken aufbewahrt werden. Kleidermotten mögen bestimmte Gerüche nicht, so dass sich Duftsäckchen empfehlen, die z.B. Lavendel oder Kampfer enthalten. Auch das stark duftende Zedernholz eignet sich bestens.




## Getreideplattkäfer

- **Aussehen und Eigenschaften:** Larven gelblich, glänzend, bis 4 mm, schlank. Käfer braun, flach und schlank, bis 3 mm.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Getreideprodukte, Teigwaren, Nüsse, Mandeln, vor allem kohlenhydratreiche Produkte.
- **Schäden, Befall:** Frassschäden an Lebensmitteln durch Larve und Käfer.
- **Bekämpfung:** Befallene Lebensmittel für 10 Tage einfrieren oder 2 Stunden auf 60–80 °C im Backofen erhitzen, dann wegwerfen, Vorräte in fest schliessenden Dosen aufbewahren (Neubefall vermeiden).




## Mehlkäfer

- **Aussehen und Eigenschaften:** Larven gelblichbraun, bis 20 mm («Mehlwürmer»). Käfer schwarz-braun, bis 18 mm.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Vor allem Mehl und Getreideprodukte aber auch viele andere tierische und pflanzliche Produkte, Mehl wird klumpig und riecht muffig, fliegt im Sommer oft in Wohnungen und fällt wegen seiner Grösse leicht auf.
- **Schäden, Befall:** Frass an Lebensmitteln und morschem Holz.
- **Bekämpfung:** Selten notwendig, da die Tiere wegen ihrer Grösse schnell auffallen und wegen ihrer langsamen Entwicklung nicht zur Massenvermehrung neigen, befallene Lebensmittel wegwerfen.




## Dörrobstmotte

- **Aussehen und Eigenschaften:** Raupe bis 17 mm, gelblich-weiss, rötlich oder grünlich. Vorderflügel der Falter innen silbergrau, aussen mit rötlicher bis bronzefarbiger Binde.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Fast alles, was an pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt, vor allem Getreide und Getreideprodukte, Nüsse, Mandeln, Trockenobst und Schokolade.
- **Schäden, Befall:** Frass, starke Verunreinigung durch Spinnfäden und Kotkrümel, Larven können im gesponnenen Kokon eventuell monatelang ohne Weiterentwicklung ruhen, plötzlich treten dann wieder Falter in der Wohnung auf, Larven kriechen auf der Suche nach Verpuppungsorten oft an Wänden und Decken umher.
- **Bekämpfung:** Befallene Vorräte wegwerfen, Lebensmittel in fest schliessenden Dosen aufbewahren (Neubefall vermeiden).



## Schaben (Küchenschabe, Deutsche Schabe, Schwabenkäfer, Kakerlake)

- **Aussehen und Eigenschaften:** Deutsche Schabe: 11-14 mm, lehmgelb bis braun, Eikapsel hellbraun, 6-8 mm deutlich gekammert. Küchenschabe: 23-28 mm, kastanienbraun bis lackschwarz, Eikapsel dunkelbraun bis schwarz, 10-11 mm.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Vor allem saftreiche, weiche pflanzliche Produkte aber auch Abfälle, Aas und andere Produkte tierischer Herkunft, weiche faulende Materialien (Gewebe, Leder, Papier).
- **Schäden, Befall:** Übler Geruch (Ausscheidungen durch Stinkdrüsen), Frassschäden an Vorräten und verschiedenen Materialien, Verunreinigungen, Übertragung von Mikroorganismen (vorratsschädigende und krankheitserregende Bakterien und Pilze sowie tierische Parasiten), Hervorrufen von Allergien,




sehr lichtscheu, deshalb tagsüber schwer zu entdecken, sie werden erst in der Dämmerung aktiv.

- **Bekämpfung:** Bekämpfung schwierig, da verborgen lebend, meist im ganzen Haus vorkommend, Bekämpfungsaktionen müssen den ganzen befallenen Bereich erfassen und sollten nur von einer professionellen Schädlingsbekämpfungsfirma mit den jeweils neuesten Mitteln und Verfahren durchgeführt werden. Fugen abdichten, keine Essensreste offen stehen oder auf dem Boden liegen lassen, Abfälle laufend entsorgen, Köderdosen mit Lockstoffen aufstellen, etwa 3 Monate stehen lassen, damit auch Jungtiere erfasst werden.

### Speckkäfer

- **Aussehen und Eigenschaften:** Larve bis zu 13 mm lang, länglich, stark behaart. Käfer etwa 8-11 mm gross, helle Haarbinder auf den Flügeln, Grundfarbe braunschwarz.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Produkte tierischer Herkunft, wie Fleisch, Wurst, Speck u.ä., aber auch Materialschädling an Fellen, Häuten usw.
- **Schäden, Befall:** Gesundheitsschäden durch Haare der Larven (Allergien, Darmerkrankungen). Frassschäden an Lebensmitteln. Lochfrass an Textilien, im Freien an Aas und in Vogelnestern, Erkennung auch durch Käfer, die an geschlossenen Fenstern sitzen, um ins Freie zu gelangen sowie an den leeren Larvenhäutchen an den befallenen Produkten.
- **Bekämpfung:** Lebensmittel verschlossen lagern, gefährdete Materialien auf Befall untersuchen.




### Silberfischchen

- **Aussehen und Eigenschaften:** 7-11mm langes, flügelloses Insekt, Körper mit silberglänzenden Schuppen bedeckt, 3 Schwanzanhänge. Eier: zuerst weiss, später bräunlich, länglich oval 1.5 x 1.0 mm. Larven: Aussehen wie Elterntiere nur kleiner. Das Weibchen legt im April bis August bis zu 100 Eier in Ritzen und Fugen.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Lichtscheu, halten sich tagsüber versteckt in Ritzen und Spalten, Futtersuche bei Nacht, bevorzugen warme und feuchte Lebensräume. Stärke- und Zuckerhaltige Stoffe wie Mehl, Griess, Haferflocken, Mehlkleister – daher auch Massenaufreten bei geklebten Papiersäcken oder Schachteln, geklebten Tapeten.
- **Schäden, Befall:** Kotpuren.
- **Bekämpfung:** Natürliche Feinde sind Spinnen. Beseitigung der Versteckmöglichkeiten durch Verschliessen von Fugen und Ritzen mit anorganischem Material. Trocknung der Räume und Beseitigung der Feuchtstellen.



## Asseln

- **Aussehen und Eigenschaften:** Asseln sind eigentlich landlebende Krebse. Ihre Kiemenanhänge, die immer von einem Wasserfilm überzogen sein müssen, ermöglichen ihnen die Luftatmung. Sie besitzen sieben Paar gleichförmige Beine, ihr Körper ist flachgedrückt. Die Kellerassel zeigt sich einfarbig grau, die Mauerassel ist schwärzlich-braun und hat auf dem Rücken zwei helle Fleckreihen. Ebenso heimisch ist bei uns die Rollassel, deren Körper glatter ist. Sie rollt sich bei Gefahr ein. Diese Asselarten ernähren sich vorwiegend von pflanzlichen Abfällen, Pilzen usw. Asseln werden etwa 14 bis 15 mm lang.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Asseln werden häufig in feuchten Kellern gefunden – im Freien leben sie unter Steinen, an faulendem Holz oder auf dem Kompost.
- **Schäden, Befall:** Kotspuren, pilzbesetztes Holz sowie Vorräte an Kartoffeln und Obst können durch Frass geschädigt werden, sonst unbedenklich.
- **Bekämpfung:** Türöffnungen, vor allem Richtung Garten, können eine Backpulverbarriere erhalten, die ab und zu erneuert werden muss. Es ist wichtig, auch die Versteckmöglichkeiten der lichtscheuen Tiere zu beseitigen und also Löcher und Fugen mit Spachtelmasse abzudichten. Grössere Mengen Asseln kann man gut mit halbierten Kartoffeln oder Rüben (am besten angefault) anlocken. Auch Blumentöpfe, locker mit Moos oder Holzwolle gefüllt und mit der Öffnung gegen die Wand gelehnt, locken die Tiere an. So angelockte Asseln sollte man auf den Kompost geben, wo sie beim Zersetzen der organischen Materialien sehr hilfreich sind.



## Ratten und Mäuse

- **Aussehen und Eigenschaften:** Aussehen allgemein bekannt. Kot der Ratte etwa 2 cm lang, 4-5 mm Durchmesser, eine Seite spitz ausgezogen. Kot der Hausmaus etwa 3-6 mm lang und 2-3 mm Durchmesser.
- **Vorkommen, befallenes Gut:** Lebensmittel aller Art.
- **Schäden, Befall:** Frass, Verunreinigung durch Kot, Urin und Haare, Übertragung von Krankheitserregern, Materialschäden.
- **Bekämpfung:** Mausefalle, Bekämpfung mit Ködermitteln (Mischung eines Nahrungsmittels mit einem Gift, meist Substanzen, die die Blutgerinnung hemmen), Vorsicht mit chemischen Bekämpfungsmitteln: nur an Stellen auslegen, die für Kinder und Haustiere nicht erreichbar sind!



**Hotline des Mieterinnen- und Mieterverbands**  
0900 900800  
CHF 4.40/Min.  
werktags von 9-12:30 Uhr,  
montags von 9-15:00 Uhr  
Rechtsauskünfte durch spezialisierte Jurist\*innen